

IHR WEG ZUR GENESUNG

Ihr Arzt hat Ihnen Veregen® 10% Salbe für die lokale Behandlung Ihrer Feigwarzen verordnet. Einen guten Therapieerfolg erzielen Sie, wenn Sie die Behandlung konsequent durchführen.

Veregen® enthält **Wirkstoffe** aus Grüntee-Extrakt, auch **Sinecatechine** genannt. Sie hindern infizierte Hautzellen an der Vermehrung und **aktivieren** am Auftragungsort die **körpereigene Immunabwehr**.



DAS MÜSSEN SIE WISSEN

ANWENDUNG

- Salbe (ca. 0,5 cm Salbenstrang) konsequent **3x täglich** auf den betroffenen Hautbereich auftragen.
- Nach dem Auftragen einen Moment mit dem Anziehen warten – die Salbe muss einziehen.
- Vor erneutem Auftragen der Salbe ist **kein Abwaschen der alten Schicht** nötig.
- Während der Behandlung können unsichtbare Feigwarzen, sogenannte „Schläferwarzen“, sichtbar werden und fälschlicherweise eine Verschlechterung unter Behandlung vermuten lassen. Berücksichtigen Sie diese bei der Behandlung ebenso wie neue Warzen.
- Vor und nach Auftragen der Salbe gründlich die **Hände waschen**.
- **Behandlungszeitraum: bis alle Feigwarzen abgeheilt sind** oder max. 16 Wochen.

HINWEISE

- Die Salbe hat eine bräunliche Farbe (auswaschbar) und kann Verfärbungen verursachen – Unterwäsche sollte **bei 60° C waschbar** sein.

SO KOMMEN SIE GUT DURCH DEN ALLTAG

HYGIENE

- **Tägliche Intimpflege** (mindestens 1x tgl.) mit unparfümierten Waschlotionen und lauwarmem Wasser.
- **Duschen / Baden:** Salbe erst danach auftragen.
- Vorläufiger **Verzicht auf Intimirasur** vermeidet Schnittverletzungen und kleine Blutungen.
- Falls gewünscht: Schamhaare stattdessen mit einer Schere kürzen, was auch den Salbenverbrauch verringert. (Bitte danach Schere desinfizieren!)
- **Menstruation & Tampons:** erst den Tampon einführen, dann die Salbe auftragen.
- **Unbeschnittene Männer mit Genitalwarzen unter der Vorhaut:** tägliche Intimpflege beugt einer Vorhautverengung vor.

LIEBESLEBEN

- **Vor dem Sex:** Salbe abwaschen – die Reißfestigkeit von Kondomen kann beeinträchtigt werden.
- **Nach dem Sex:** Salbe wieder auftragen.

Bei sexuellem Kontakt bis zur vollständigen Abheilung der Erkrankung bitte **Kondom** oder **Femidom** verwenden.

NEBENWIRKUNGEN

- ⦿ Vor allem in den ersten Behandlungswochen sind für viele Patienten leichte lokale Hautreaktionen spürbar. Bitte unterbrechen Sie die Behandlung nicht.
- ⦿ Leichte, **lokale Reaktionen** wie Rötung, Juckreiz, Hautreizung, Schmerzen oder Schwellungen an oder um die behandelte Stelle können auftreten. Diese sollten sich nach den ersten Wochen der Behandlung bessern.

IN DER PARTNERSCHAFT

Wurden bei Ihnen Feigwarzen diagnostiziert, **sprechen** Sie vertrauensvoll mit Ihrem **Partner**.

Bitte
halten Sie
Rücksprache
mit Ihrem
Arzt.

i Genitalwarzen sind sehr ansteckend. Selbst wenn noch keine Symptome bei Ihrem Partner auftreten, könnte er bereits infiziert sein. Eine ärztliche Kontrolle und eventuelle Mitbehandlung kann deshalb sehr hilfreich sein.

Übrigens: Das plötzliche Auftreten von Feigwarzen steht nicht gleichbedeutend für sexuelle Kontakte außerhalb einer Partnerschaft. Eine Infektion kann sehr lange zurückliegen – Zeitpunkt und Ort einer Ansteckung sind deshalb kaum nachzuvollziehen.

WAS VOR DEM SEX UNERLÄSSLICH IST

Meistens werden Feigwarzen beim Sex übertragen: Die Erreger befinden sich in abgeschliffenen Hautzellen und finden über kleinste Hautverletzungen den Weg in den Körper. Haben Sie während des Behandlungszeitraums Sex, kann ein Kondom Ihren Partner/Ihre Partnerin vor einer Infektion schützen.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Veregen® 10% Salbe vor dem Sex gründlich abwaschen! Da die Salbe die Reißfestigkeit von Kondomen beeinträchtigt, sollten Sie Ihren Arzt zudem nach alternativen Verhütungsmethoden fragen.

Diese Information wurde Ihnen überreicht von:

Mit freundlicher Unterstützung von:

Arztstempel

 **Dr. Pflieger**
ARZNEIMITTEL

Dr. Pflieger Arzneimittel GmbH
Dr.-Robert-Pflieger-Straße 12
96052 Bamberg

www.dr-pflieger.de